

İmal tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Şarj numarası  
Ruhsat tarihi ve numarası: 26.06.2012 / 8739

#### KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasında ki Süre
Bağ *	Mildiyö ( <i>Plasmopora viticola</i> )	500 g/100 L su	14 gün
	Ölükol ( <i>Phomopsis viticola</i> )	3500 g/100 L su (kış uygulaması) 500 g/100 L su (yaz uygulaması)	
Elma	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	1500 g/100 L su	14 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen ( <i>Wilsonomyces carpophylus</i> )	1250 g/100 L su (Dormant dönem) 625 g/100 L su (Normal dönem)	14 gün
Şeftali	Yaprak kıvrıklığı ( <i>Taphrina deformans</i> )	1500 g/100 L su	14 gün
Zeytin	Halkalı leke ( <i>Spilocaea oleaginea</i> )	1. Uygulama 1500 g/100 L su 2. Uygulama 1000 g/100 L su	14 gün

(\* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

ertarkimya

ERTAR KİMYA  
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

## ERTAR BORDO 20 WP

(Kullanıma Hazır Bordo Bulamacı)  
Islanabilir Toz (WP)

GRUP	M: 1	Fungisit (Mantar İlacı)
------	------	-------------------------

%20 Metalik Bakır'a eşdeğer bordo bulamacı

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ağızda madeni bir lezzet, kanlı ishal, yeşil mavi renkli kusma, hızlı soluma, heyecan, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme, fazla miktarda alındığında (5-8 g) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Solunması Halinde;** Sakin olun ve temiz havaya çıkın. Hastayı rahatça alabildiği bir konumda tutun. Acilen tıbbi yardım isteyin.

**Cilt Teması Halinde;** Bol su ve sabunla yıkayın. Zedelenme olursa tıbbi yardım isteyin.

**Göz ile Teması Halinde;** Bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Tıbbi yardım isteyin.

**Yutulması Halinde;** Tıbbi yardım isteyin ve ürünün etiketini gösterin. Tıbbi tavsiye; gastrik yıkama BAL, EDTA veya PENICILAMINE uygulayın. Semptomatik tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114



Net miktarı:  
Azami perakende satış fiyatı:

#### İÇİNDEKİLER

1. Teknik Bordo Bulamacı

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



#### UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

**H314:** Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

**H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.

**H332:** Solunması halinde zararlıdır.

**H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.

**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ (P)

**P261:** Spreyini solumaktan kaçının.

**P273:** Çevreye verilmesinden kaçının.

**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**P403+P233:** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

**P501:** İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Ürünü ambalajında, kapalı olarak ve serin yerlerde muhafaza ediniz.
- Karışımı uzun süre püskürtücünün içinde tutmayınız.
- Ambalaj torbalarını tekrar kullanmayınız.

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Acıdereosb Mah. Zaferan Cad. No : 8  
Sarıçam / ADANA Tel : 541 19 14 Fax : 456 19 47  
Yüreğir Vatan 036 2756

Metin ÇAKIRKAN  
Şirket Vekili

10 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) GENEL MÜDÜRÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

10

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

### Bağda mildiyösü:

- 1.Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığına uygulamalara son verilmelidir.

### Bağda ölükol:

Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz uygulaması:

Uygulama: 2-3 cm olduğunda,

Uygulama: 8-10 cm olduğunda,

Uygulama: 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

### Elma karalesesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar: ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

### Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen: (Çil) (Kayısı)

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcuqları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.uygulama yapılmalıdır.

### Şeftali yaprak kıvrıklığı:

Tomurcuqlar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

### Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, Ege bölgesinde:

1. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz bölgesinde:

1. Uygulama: Hasattan sonra
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
- 3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

**ERTAR BORDO 20 WP** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M: 1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ERTAR BORDO 20 WP'** nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M: 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

**ERTAR BORDO 20 WP** diğer bitki koruma ürünleri ile (insektisit, fungusit, bitki gelişim düzenleyicileri vs.) karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.



**ERTAR KİMYA**  
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

## ERTAR BORDO 20 WP

(Kullanıma Hazır Bordo Bulamacı)  
Islanabilir Toz (WP)

GRUP	M: 1	Fungisit (Mantar İlacı)
------	------	----------------------------

%20 Metalik Bakır'a eşdeğer bordo bulamacı

### ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel antidotu olmayıp, belirtilere göre tedavi edilir. Aktif kömür ile mide yikanır. Dolaşıma yardım maksadıyla plazma ve Novadrol tatbik edilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114



### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

### RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

**ertarkimya**  
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No : 8  
Sarıçam / ADANA Tel : 456 19 44 Fax : 456 19 47  
Yürürlük No : 456 27 56  
**Metin OCAKTAN**  
Şirket Vekili

10 Mart 2021  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
TARIM KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL

&