

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Otlar	Dozu	Uygulama Zamanı
Şeker Pancarı	Yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i> , <i>Avena fatua</i>)	1000 ml/da Hafif ve orta topraklarda uygulanır.	Ekim öncesi tırmık veya küürmler altına uygulanır.
	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)		
	Salkım otu (<i>Poa annua</i>)		
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
	Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)		
	Serçe dili (<i>Stellaria media</i>)		
	Sarmaşık çoban değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)		
	Kışniş otu (<i>Spergula arvensis</i>)		
	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
	Yavşan otu (<i>Veronica persica</i>)	1100 ml/da Ağır ve humuşça zengin topraklarda uygulanır.	
	Tarla akça çiçeği (<i>Thlaspi arvense</i>)		
	Düğme otu (<i>Galinsoga parviflora</i>)		
	Kara pazı (<i>Atriplex spp.</i>)		
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)		
	Adi diş otu (<i>Galeopsis bifida</i>)		
	Papatya (<i>Matricaria arvense</i>)		
	Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)		
Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)			
Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)			

COLOSSUM SE, tohumla çoğalan, tek yıllık dar ve geniş yapraklı birçok yabancı otu kontrol eder. Çok yıllık yabancı otları kontrol etmez. **COLOSSUM SE**, yabancı otların kökleri tarafından alınarak etkili olmaktadır. Çimlenmekte olan yabancı otlar ilacı olarak toprak yüzeyine çıkmadan veya çıkıştan kısa bir süre sonra ölür. Bunu sağlamak için ilacın iyi hazırlanmış, keseksiz ve rutubetli toprağa atılması gereklidir. **COLOSSUM SE** kısmen gaz haline dönüşürken etki ettiğinden uygulandıktan hemen sonra mutlaka toprağa karıştırılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilacı su deposuna ilave edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

COLOSSUM SE

SÜSPO-EMÜLSİYON (SE)

GRUP	C1;N	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

244 g/l Chloridazon + 150 g/l Tri-allate

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız.

Doktor çağırınız, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürün.

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P302+P352)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Yutulması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P301+P312)

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:

İÇİNDEKİLER

1. Chloridazon
2. Tri-allate

ZARARLILIK İŞARETİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
P301+P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayınız.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.
P391: Döküntüleri toplayınız.
P405: Kilit altında saklayınız.
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.

- EUH208: Chloridazon ve Tri-allate içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

27 Mart 2017

ERTAR KİMYA TAR. ÜRN. VE
ALET. İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
Acidere Org. San. Böl. Mah. Zafer Cad. No: 8
Sarıçam / ADANA

Yüreğir V.D. 372 036 2756

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

COLOSSUM SE, pancar tarlalarında dar ve geniş yapraklı yabancı otlar için kullanılır. Keseksiz olarak hazırlanan tohum yatağı yüzeyine uygulanır. İlaç atımından hemen sonra tırmık veya kürümler ile yüzeysel (3-5 cm) olarak toprağa karıştırılmalıdır. Daha sonra ekim yapılır. Hava şartları müsait değilse ekim bir kaç gün sonra yapılabilir. Toprak yüzeyi kuru ise, ekim sonrası ve pancar çimlenmeden önce merdane çekilerek toprak bastırılmalıdır. Kullanılacak su miktarı dekara 20-40 litre olmalıdır. İlaçlamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm olmalıdır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ

COLOSSUM SE' nin etki süresi toprak yapısı ve iklim şartlarına göre bir kaç hafta ile bir kaç aya kadar sürebilir. Herhangi bir sebepten dolayı pancar bozulursa (sel, dolu, çimlenme sorunu vs.) aynı tarlaya; pancar, patates veya mısır ekilebilir. **COLOSSUM SE** tavsiyeye uygun kullanılırsa, pancarın normal hasadından sonra ekilen Kültür bitkilerinde herhangi bir fitotoksite yapmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

COLOSSUM SE, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1+N olarak sınıflandırılmış bir herbisittir Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **COLOSSUM SE'** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1+N harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Eğer bir karışım yapılmak isteniyorsa, ön karışım testi yapılmalıdır.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

COLOSSUM SE

SÜSPO-EMÜLSİYON (SE)

GRUP	C1;N	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	------	--------------------------------

244 g/l Chloridazon + 150 g/l Tri-allate

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anlara zehirsizdir.
- Balıklara zehirlidir.
- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- İlaçlama sırasında komşu tarlalara ilacın kaçırılmamasına dikkat edilmelidir.
- Kullanılacak ilaçlama aletlerinde diğer ilaçların özellikle hormon içeren hububat yabancı ot ilaçlarının kalıntıları bulunmamalıdır.
- Ekimden hemen önce, özellikle hafif topraklarda, fazla miktarda gübre kullanmaktan kaçınılmalıdır. Ahır gübresi kullanılacaksa ilkbaharda değil, sonbaharda uygulanmalıdır.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Uygulamadan sonra ilaçlama aleti deposunu iyice yıkayıp temizleyiniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr



GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

27 Mart 2017

ERTAR KİMYA TAR. ÜRN. VE
ALET. İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Acidere Org. San. Böl. Mah. Zafer Cad. No: 8
Sarıçam / ADANA
Yüreğir V.D. 372 036 2756