

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 01.05.2008 – 6324

KULLANILACĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antepfıstığı	Antepfıstığı psilidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	30 ml/100 L su	3 gün
Armut	Armut psilidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	50 ml/100 L su	3 gün
Ayçiçeği	Çayır tırtılı (<i>Loxostege sticticalis</i>)	25 ml/da	3 gün
	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	75 ml/da	
Bag*	Dürmece (<i>Spartanotus pilieriana</i>)	50 ml/100 L su	3 gün
	**Bag sakım güvesi (<i>lobesia botrana</i>)	30 ml/100 L su	
Domates (Sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	50 ml/100 L su (larva)	3 gün
Elma	Elma içkürdü (<i>Cydia pomonella</i>)	15 ml/100 L su	3 gün
	Elma ağkürdü (<i>Yponomeuta malinellus</i>)	5 ml/100 L su	3 gün
Fasulye	Yaprakbiti (<i>Aphis spp.</i>)	50 ml/da	3 gün
Fındık	Kırtırtılı (<i>Lymantria dispar</i>)	30 ml/100 L su	3 gün
	Süne (<i>Eurygaster spp.</i>)	30 ml/da (1-3 dönem nimf) 50 ml/da (4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin)	3 gün
Hububat	Hububat hortumlu böceği (<i>Pachytychius hordei</i>)	30 ml/da	3 gün
	Ekin kamburböceği (<i>Zabrus spp.</i>)	20 ml/da (Sahı uygulaması)	3 gün
Kabak	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/da	3 gün
Kiraz	Kiraz sineği (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	25 ml/100 L su (Ergin)	3 gün
Vişne	Mantolu böcek (<i>Amicta oberthuri</i>)	30 ml/da	3 gün
Mercimek-Nohut	Mercimekte Apion (<i>Apion aragons</i>)	50 ml/da	3 gün
	Mercimek hortumlu böceği (<i>Sitona crinitus</i>)	50 ml/da	
	Yeşilkurt (<i>Heliothis virescens</i>)	20ml/da	



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BELAİR 2,5 EC

Emülsiyon Konsantr (EC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	-----------------------------

25 g/l Deltamethrin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya ilaç bitki üzerinde kuruduktan sonra girilmesinde bir sakınca yoktur.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNEMLERİ

Deri ile Teması Halinde: Temastan sonra hemen bol su ve sabun ile en az 15 dakika yıkayınız. İlk su tahriş şiddetinin artmasına neden olabilir. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora gidiniz.

Soluması Halinde: Etkilenen kişiye temiz havaya çıkartınız ve sakin bir şekilde yatırınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Yutulması Halinde: Hastayı/ yaralıyı kırıptatmayınız, dinlendiriniz. Ağrı çalkalayınız. Kusurtmayınız. Yutuduktan sonra kusma halinde maddenin akıgırlere geçme ihtimali vardır. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulanır.

Net Miktarı:
Azamı Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER
Deltamethrin

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H226: Alevlenir sıvı ve buhar
- H301: Yutulması halinde toksiktir.
- H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.
- H315: Cilt tahrişine yol açar.
- H318: Ciddi Göz hasarına yol açar.
- H331: Soluması halinde toksiktir.
- H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sığara içilmez.
- P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız
- P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanınız.
- P405: Kilit altında saklayınız.
- P501: İçerdiği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanıma talimatlarına uyun.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

4. Mart 2026



ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereoslu Mah. Zafar Cad. No: 8
Sarıcam/DAĞ (Etiler) 19 44 Fax: 456 19 47
Yüzeyi V.D: 372 036 2756
Maksis Nd: 0372036275600012

Dr. Zeynel

Ruhsatlandırıcı

Mısır	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia</i> spp.)	50 ml/da (15 gün ara ile 3 uygulama)	3 gün
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	30 ml/da	3 gün
Patlıcan (Tarla)	Tütün beyazineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/da (larva-pupa-ergin)	3 gün
Pırasa	Thrips (<i>Thrips tabaci</i>)	50 ml/da	3 gün
Şekerpancarı	Bozkurt (<i>Agrotis</i> spp.) Kalkan böceği (<i>Cassida</i> spp.) Şekerpancarı piresi (<i>Chaetocnema</i> spp.)	25 ml/da	3 gün
Zeytin	Zeytin güvesi (<i>Prays oleae</i>) Zeytin karaköşnili (<i>Saissetia oleae</i>) Zeytin sineği (<i>Bactrocera oleae</i>)	30 ml/100 L su 25 ml/100 L su 25 ml/100 L su	21 gün

****Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.**

***Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.**

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda değilse karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırmaya devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde Uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Anteplendiği psilidi:

Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Armut psilidi:

Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15' den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BELAİR 2,5 EC

Emülsiyon Konsantr (EC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
25 g/l Deltamethrin		

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
04 Ekim 2026



ertarkimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Akatlar Cad. No : 8
Sancaktepe/İSTANBUL
Tic. Sic. No : 27556
Yatırım No : 0372036275600012

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bekleme süresine uyunuz.
- Kuru ve serin yerde saklayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış mahsulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Ürünü rüzgârla sürüklenmenin olabileceği havalarda kullanmayınız.
- Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- Boş kutuları usulüne göre imha ediniz, başka bir amaçla kullanmayınız.

Dr. Zeynel AK
Ruhsatlandırmı

Ayıcığında Çayır tırtılı:

Bir bittide 3-5 adet larva veya metrekarede 10 adet larva saptandığında mücadeleye başlanmalıdır. Mücadele en geç üçüncü dönem larvalara karşı yapılmalıdır.

Ayıcığında Yeşilkurt:

100 bittiden 5'inde yumurta, birinci dönem larva veya zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.

Bağda Dürmece:

İlk baharda larvaların kışaklardan çıkıp uyanan asma gözlerine ilk geldiği tarihten itibaren 10 ve 30 gün sonra yapılmalıdır.

Bağ salkımlı güvesi:

Uygulama zamanının saptanmasında eşeysel geçici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı, yumurtanın açılımının takibi, alacakaranlık sıcaklıkları ve fenolojik dönemler gibi kriterlerden yararlanılmaktadır. Insektisit uygulamasında larvaya veya yumurtaya etkili insektisit seçimi dikkate alınır.

1.dölede larvaya etkili insektisit kullanımında alacakaranlık sıcaklığının üst üste en az 2 akşam 15°C'nin üzerinde olması, etkili sıcaklıkların 120 gün dereceye yaklaşması ve salkımlı fenolojinin çiçek tomurcuğu döneminde yapılan kontrollerde Orta Anadolu'da %20, diğer bölgelerde %1 buluşma saptanması halinde ilaçlamaya uyulması gerekir.

2.dölede larvaya etkili insektisit kullanımında etkili sıcaklıkların 520 gün dereceye yaklaşması ve asmanın fenolojinin koruk döneminde olması gerekir.

3.dölede larvaya etkili insektisit kullanımında etkili sıcaklıkların 1047 gün dereceye yaklaşması ve üzümün tatlanma başlangıcı veya olum döneminde olması gerekir.

Sıcaklık değerleri elde ediliyorsa, 1. döle karşı çiçek tomurcuğu döneminde, 2. döle karşı saçma tanesi iriliğinde veya tanelerin nohuttan büyük olduğu devrede, 3. döle için meyve tatlanma başlangıcı veya olgunluk döneminde uygulanabilir.

Domates (Sera) Yeşilkurt:

Seradaki yoğunluğu saptanmak üzere seçilen 50-100 bittinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünleri incelenerek meyvedeki buluşma oranı %5'e ulaştığında ilaçlamaya başlanır.

Elma ağkurdur:

Bançeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Elma içkurdur:

Elma içkurdur'u yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdur mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilacli bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Fasulye Yaprakbitti:

Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bittiklerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50; patlıcan, kabakgiller ve lahanalar gibi büyük yapraklı bittiklerde 20-40 adet yaprakta lupla sayılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye karar verilir.

Fındık Kırtırtılı:

Bulasık fındık bahçelerinde 10 dekara kadar olan büyüklüklerde 10 ocakta, 10-30 da büyüklüklerde 20 ocakta, 30 dekardan büyük olanlarda 30 ocakta sayım yapılır. Her ocağın 10'ar yaprağında sayım yapılır. 100 yaprağa isabet eden larva sayısı 1 adedi geçince uygulama yapılmalıdır. Uygulama larva çıkışından hemen sonra, mayıs içerisinde yapılmalıdır. Bir uygulama yeterlidir.



ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat

Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BELAİR 2,5 EC

Emülsiyon Konsantr (EC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
25 g/l Deltamethrin		

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

C 4, Marten 2026

ertarkimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb. Mh. Zafar Cad. No : 8
Sarıçamlı/ADANA / TEL: 459 19 44 Fax: 456 19 47
YURTDIŞI TEL: 372 036 2756
MES. NO: 372036275600012

Dr. Zeynel AK
Ruhsatlandırm

Hububat Ekin Kamburboceği:

Tohum uygulaması, bir yıl önce zararların var olduğu bilinen alanlarda, yüzey ilaçlaması ise larva zararının belirgin görüldüğü geç sonbahar ya da erken ilkbaharda yapılır.

Hububat hortumlu böceği:

Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (sapa kalkma dönemi) uygulama yapılır.

Hububat Süne:

Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Sebzelerde Beyazsinek (Kabak ve Patlıcan (Tarlal)):

Genel olarak 5 dekarlık alan bir ünite olarak kabul edilir. Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Kabak ve patlıcan gibi büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Kıraz ve Vişne Kırza sineği:

Görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içerisinde uygulamanın yapılması gereklidir.

Mercimek hortumlu böceği:

Kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğu fazla olduğu durumlarda bitkiler 5-10 cm boyundayken bir kez ilaçlama yapılır.

Mercimekte Apton:

Ergin mücadelesinde m² ortalama 3-5 ergin veya daha fazla olduğunda, larva için bitki başına 3 veya daha fazla larvalı çiçek tomurcuğu olduğunda veya tepede tomurcuğlarında %10'un üzerinde bulaşma olduğunda uygulama yapılır.

Mercimekte Yeşilkurt:

Doğal düşmanların bu zararlıyı başta tutması nedeni ile ülkemizde kimyasal mücadeleye gerek görülmemektedir. Ancak doğal düşmanların yetersiz olduğu tarlalarda kimyasal mücadele yapılabilir.

Mercimekte Mantolu böcek:

Çok yoğun bulaşmalarda uygulama yapılmalıdır.

Mısır Koçankurdu:

1. ürün mısırda bulaşık bitki sayısı %5 ve üzeri ise koruyucu uygulama yapılır. 2. ürün mısırda bitki boyu 40-50 cm olduğunda ışık tuzaklarında yakalanan ergin sayısı 5-10 adet/hafta olduğunda, tarlalar haftada en az iki kez kontrol edilerek ilk yumurta tespiti çalışılmalıdır. 1. ve 2. üründen 50 dekarlık tarlada zikzak şeklinde gidilerek 100 bitkide kontrol yapılır. 1. üründen bulaşma, 2. üründen yumurta paketi kontrolü ve sayımı yapılır. İlaçların etki süreleri dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile 2 ya da 3 ilaçlama yapılmalıdır. Şeker mısırında, taze tüketim amacıyla kullanılan mısırlarda ve silajlık mısırlarda kimyasal mücadele uygulanmamalıdır.

Patates böceği:

Günlük ortalama sıcaklık 14-15°C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlıların yumurta, larva ve erginleri aranır. Herhangi bir döneme rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci dölde karşı uygulama yapılacaktır. bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci dölde uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklennmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafında tolere edilebilirliğinden uygulama gerektirebilir. Larvalar ilk gelişme döneminde yaprakların alt yüzeyinde bulunduklarından yaprak altlarının ilaçlamasına özen gösterilmelidir. Tohumluk uygulama ise dikim öncesi yumurta ilacın etiketinde önerildiği şekilde uygulanır.



ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BELAİR 2,5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
25 g/l Deltamethrin		

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

04 Ocak 2026

FİRMA BEYANI

Original ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı: ürünün hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

ertarkimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb
SarıcamıADAN
Yur. Gü. No: 3372 036 2756
Mersis: No: 0372036275600012

Dr. Zeynel AL
Ruhusalandırım

Pirasa da Tütün tripsi:

Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde ise 20 adet ise mücadele yapılır.

Şekerpancarında Bozkurt:

Tohum ilaçlamasında; ekimden önce 1 m²'de ortalama 2 larva veya küme halindeki yabancu otlarda ortalama 1 larva varsa tohum ilaçlaması yapılır. Yeşil aksam ve zehirli yem uygulamasında; şeker pancarının çıkışından sonra tarlaların köşegenleri doğrultusunda gidilerek, en az 5 ayrı yerde 3'er metre sıra uzunluğundaki bitkilerin dipleri kontrol edilir. En az bir kesik bitkiye rastlandığında ve 3 adet larva sayısına ulaşıldığında mücadeleye başlanmalıdır.

Şekerpancarın piresi:

Tohum ilaçları, çıplak tohumu uygulandıktan sonra, çıkıştan sonra 35-40 gün süreyle Pancar pirelerini kontrol ettiğinden, normal şartlarda bu dönemde ayrıca bir ilaçlama gerekmemektedir. Ancak zararlı popülasyonunun yüksek olması halinde, yaprakların %20'si zarar görmüşse zaman kaybetmeden yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.

Şekerpancarında Kalın böceği:

Tarlaların köşegenleri doğrultusunda hareket ederek zararlı yoğunluğu tespit edilir ve m² de 20 ergin görüldüğünde ilaçlı mücadeleye başlanır.

Zeytin güvesi:

Zararının çiçek dönünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10' dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dönünde ilk kelekelerin yakalanmasından 7-10 gün sonra bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dönüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10'unda canlı "Yumurtalı+larva" olduğunda ilaçlama yapılır.

Zeytin karaköşnili:

Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50'sinin açıldığı devrede birinci, %90' ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytin sineği:

Yapılan vuruk kontrollerinde (800-1000 adet meyve), salımlılık çeşitlerde %1, yağlık çeşitlerde ise %3-4 vuruk saptandığında, zehirli yem kısmı dal ilaçlaması veya kaplama ilaçlama şeklinde yapılmalıdır.

BELAİR 2,5 EC hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BELAİR 2,5 EC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 3: A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **BELAİR 2,5 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasından (Grup 3: A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.



ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BELAİR 2,5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	-----------------------------

25 g/l Deltamethrin

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

04 Ocak 2026

ertarkimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat

Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No : 8

Sarıçam/ADANA TEL: 372 036 2756

YURTDIŞI: 0322 456 19 47

Mercis No: 0322 456 19 47

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks: 0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

Dr. Zeynel A

Ruhsatlandırıcı