

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 01.05.2003 – 4341

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antepfıstığı	Antepfıstığı psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	25 ml/100 L su (Yaprakların % 20'si bulaşık olduğunda ilk uygulama yapılır.)	7 gün
Armut	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	20 ml/100 L su (Nimf, ergin) (Taç yaprakları döküldükten sonra 2. ve 3. nimf döneminde uygulama yapılır.)	7 gün
Ayçiçeği	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 ml/da (Larva)	7 gün
Bağ */**	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	20 ml/100 L su (Larva) (Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk uygulama yapılır.)	7 gün
Dişbudak	Amerikan beyazkelebeği (<i>Hyphantria cunea</i>)	25 ml/100 L su (Genç larva dönemi)	7 gün
Domates	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>) Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 ml/da (Larva-ergin) 30 ml/da (Larva)	7 gün
Elma	Elma içkurdusu (<i>Cydia pomonella</i>)	20 ml/ 100L su (Larva)	7 gün
Genel Zararlılar	Çekirgeler (<i>Locusts</i>)	40 ml/da	7 gün
Hububat	Süne (<i>Eurygaster spp.</i>)	20 ml/da 1-3 dönem (Nimf) 30 ml/da 4-5 dönem (Nimf ve yeni nesil ergin)	7 gün
Kiraz, Vişne	Ağaç kızılkurdu (<i>Cossus cossus</i>) Kiraz sineği (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	80 ml/100 L su (Genç larva dönemi) 30 ml/100 L su (Ergin)	7 gün
Mercimek	Baklagil tohumböcekleri (<i>Bruchus spp.</i>)	40 ml/da	7 gün
Mısır	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia spp.</i>) Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	30 ml/da (Larva) 15 gün ara ile 3 uygulama yapılır. (Yumurta ilk tespit edildiğinde uygulamaya başlanır.)	7 gün
Nohut	Yeşilkurt (<i>Heliothis virescens</i>)	30 ml/da (Larva)	7 gün
Patlıcan	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 ml/da (Larva, ergin)	-
Süs Bitkileri	Nergis soğan sinekleri (<i>Eumerus narcissi</i> , <i>Merodon eque</i>)	80 ml/100 L su (Tarla döneminde)	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

ertarkimya

ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ATHLETIC 25 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
250 g/l Cypermethrin		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının % üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Kişiyi temiz havaya çıkartın. Birey nefes almıyorsa suni teneffüs uygulayın. Kişiyi rahat ve sıcak tutun. Derhal tıbbi yardım alın.

Cilt Teması Sonrası: Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Hemen bol su ile yıkayınız (15 - 20 Dakika). Cilt tahrişi devam ederse doktora başvurunuz.

Göz Teması Sonrası: Derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Kusturmaya çalışmayınız. Gastrik lavaj ve katarsis tarafından çıkartın. Kan basıncını ve solunumu koruyun. Solunum depresif ise oksijen verin. Kişi bilinçsiz ise gastrik lavaj yapmayın. Derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

1. Cypermethrin

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
- H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.
- H315: Cilt tahrişine yol açar.
- H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
- H332: Solunması halinde zararlıdır.
- H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P210: Isıdan uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
- P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P405: Kilit altında saklayınız.
- P501: İçeriği/kabı yerel yetkililere uygun olarak bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zeynel Cad. No : 8
Sancağ/ADANA Tel: 469 14 44 Fax: 456 19 47
Yüreğir Y.D: 372 036 2756
Mersis No: 0872030275600012

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

Zeynel

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Şekerpancarı	Kalkan böcekleri (<i>Cassida</i> spp.)	30 ml/da	7 gün
	Pancar piresi (<i>Chaetocnema tibialis</i>)	25 ml/da	
	Yaprak Böceği (<i>Piesma maculata</i>)	30 ml/da	
	Yaprak kurtları (<i>Spodoptera exigua</i> , <i>Mamestra</i> spp., <i>Plusia gamma</i>)	30 ml/da	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANMA ŞEKLİ

Antepfıstığı psillidi:

Haftalık olarak 100 birleşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğunun açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Armut psillidi:

Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15'ten fazlasının da bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Ayçiçeğinde Yeşilkurt:

100 bitkiden 5'inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır.

Bağ Salkım güvesi:

Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tohumlama başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ATHLETIC 25 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------	----	-----------------------------

250 g/l Cypermethrin

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Faydalı böceklerle zararlıdır.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde saklayınız.
- Tavsiye edilen bitkilerde ve dozlarda fitotoksik değildir.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- İlaçlamadan sonra el, yüz ve vücudun ilaç ile temas eden yerlerini bol su ile yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

12 Haziran 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafar Cad. No : 8
Sarıçam/ADANA Tel: 459 19 44 Fax: 456 19 47
Yatırım D: 372 036 2756
Mersis No: 0372036275600012

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

Zul



ö.k

1

Dişbudak Amerikan beyazkelebeği:

Kimyasal uygulama, haziran veya ağustosta (3.döl çıkarsa eylül ayında) larvalar epidermis arasından çıkıp ağlarını örmeye başladıkları zaman (larvalar 2. ve 3. dönemde) veya yumurta kümelerindeki bütün yumurtalar açıldığında başlanmalıdır. Her dölle karşı bir uygulama yapılır.

Domates ve Patlıcanda Tütün beyazsineği:

Bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.

Domateste Yeşilkurt:

Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elma içkurdur:

Yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmez. Elma içkurdur mücadelesinde hedef, her dölle ait larva çıkışı süresince ağaçları bitki koruma ürünü uygulanmış olarak bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Çekirgeler:

Rezervasyon(Garsiyar) alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve yapılan sürveylerle, uygun yoğunluğun saptanmasından sonra derhal kimyasal mücadeleye geçilir.

Hububatta Süne:

Tarlalarda yapılan sayımlara ve değerlendirmelere göre kimyasal mücadeleye karar verilir.

Kiraz ve Vişnede Kiraz sineği:

Kaplama uygulamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük ağaçların özellikle tepe dallarının ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.

Kiraz ve Vişnede Ağaç kızkurdur:

Bulaşık bahçelerde eşeyssel tuzaklar asılarak, ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonunda veya ağaç gövde kabuklarının hemen altında koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğünde ağustos ortası ve eylül başı uygulamalara başlanır. İlacın etki süresine göre ikinci uygulama yapılır.

Mercimekte Baklagil tohumböcekleri:

Bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılacak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir.

Nohutta Yeşilkurt:

Mücadele zamanının belirlemek için bölgelerin ekolojik özellikleri dikkate alınarak, nisanın 2. yarısından itibaren kontrollere başlanmalıdır. Kontrollerde (50x50 cm=1/4m²)'lik çerçeve kullanılır. Atılacak çerçeve sayısı tarlanın büyüklüğüne göre belirlenir. Atılan çerçeve içindeki bitkiler silkelenecek yere düşen larvalar sayılır, kaydedilir. Sayım sonucunda m²'de 5 larva saptandığında mücadeleye karar verilir. Uygulamadan 10 gün sonra tarlalar tekrar kontrol edilir. Uygulamayı gerektirecek yoğunluk varsa uygulama tekrarlanır.

Mısır kurdur ve Mısır koçankurdur:

İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takriben 15 gün ara ile 3 uygulama yapılır.

Süs bitkilerinde Nergis soğan sinekleri:

Bitki boyu 10 cm olduğunda tarlayı temsil edecek şekilde her dekar için yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve bulaşma oranı %5 ise mücadele yapılmalıdır. Ergin çıkışları başladığında her iki zararlı için ilk çıkıştan 10 gün sonra ilk uygulama yapılmalıdır.

**ERTAR KİMYA**

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ATHLETİC 25 EC**EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)**

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------	----	-----------------------------

250 g/l Cypermethrin**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114****FİRMA BEYANI**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

0.2 7

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Larva Başkanı

12 Haziran 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GİD. VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

ertarkimya
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Akmer Cad. No : 8
Sançam/ADANA Tel: 0342 444 19 44 Fax: 456 19 47
Yüreğir Yrı: 37 036 2756
Mersis No: 0672036275600012

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

Şekerpancarında Kalkan böcekleri:

Tarlanın köşegenleri doğrultusunda hareket ederek zararlı yoğunluğu tespit edilir ve m² de 20 ergin görüldüğünde ilaçlı mücadeleye başlanır.

Şekerpancarında Pancar piresi:

Uzun süre devam eden sıcak ve kurak şartlarda, zararlı popülasyonunun yüksek olması halinde, yapraklarda asimilasyon alanının %20'si zarar görmüşse zaman kaybetmeden yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. Sonraki döllerin zararı, bitki tarafından telafi edildiği için genellikle değer taşımaz. Larvaların köklere olan zararı ise önemsizdir ve mücadele genellikle ekonomik değildir.

Şekerpancarında Yaprakkurtları:

Yaprakkurtları mücadelesinde esas, birinci döl larvalarının gözden kaçırılmaması olduğu için şeker pancarı ekim alanlarında nisan ayı sonundan itibaren tarla kontrolleri titizlikle yapılmalıdır. Popülasyon yoğunluğunun ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde (100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunursa) mücadeleye başlanmalıdır. Salgın halleri dışında yaprakkurtları çıkışının az olduğu yıllarda yalnızca yerel olarak görüldükleri tarlalar ilaçlanmalı, kapama ilaçlama şeklinde mücadeleden kaçınılmalıdır. Zararlı bazı yıllarda salgınlar yapmakta, bunu takip eden yıllarda ekonomik önem taşıyacak zararı olmadığından mücadelesi yapılmamaktadır.

Şekerpancarında Yaprak böceği:

Nimf ve erginler asıl zararı fide döneminde yaprak ve yaprak sap kısmında yapmaktadır. Zararlı tarla kenarlarından başlayıp iç kısımlara doğru ilerlediğinden, çimlenme başladığı andan itibaren sürveyler yapılmalıdır. Böceğin bitkiye geçiş yapmak üzere olduğu kenarlar tespit edilerek tarla kenarlarında şerit halinde ilaçlama yapılabilir.

ATHLETIC 25 EC hakkında bir şikayetiniz olması halinde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ATHLETIC 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ATHLETIC 25 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ATHLETIC 25 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	-----------------------------

250 g/l Cypermethrin

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks: 0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114



12 Haziran 2025

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Laihe Başkanı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROLE DİLMİŞTİR

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No : 8
Sarıçam/ADANA Tel: 0322 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yüreğir V.B: 0322 036 2756
Mersis No: 0872036275600012

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü