

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 09.09.2022 – 12507

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Armut	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	12,5 ml / 100 L su (Yumurta)	14 gün
	Yaprak galerigüvesi (<i>Leucoptera scitella</i>)	17,5 ml/100 L su	
Ayva	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	12,5 ml / 100 L su (Yumurta)	14 gün
Bağ*	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	15 ml/100 L su (Yumurta)	3 gün (sofralık) 28 gün (şaraplık)
Elma	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	12,5 ml / 100 L su (Yumurta)	14 gün
	Yaprak galerigüvesi (<i>Leucoptera scitella</i>)	17,5 ml/100 L su	
Erik	Şeftali güvesi (<i>Anarsia lineatella</i>)	20 ml / 100 L su	14 gün
Kayısı, Şeftali, Nektarin	Doğu meyvegüvesi (<i>Cydia molesta</i>)	17,5 ml/100 L su	14 gün
	Şeftali güvesi (<i>Anarsia lineatella</i>)	20 ml / 100 L su	
Mısır	Bozkurt (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>)	15 m/da	14 gün
	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia spp.</i>)	15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama)	
	Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama)	
Pamuk	Dikenlikurt (<i>Earias insulana</i>)	20 ml/da	21 gün
	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	17,5 ml/da	
	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	17,5 ml/da	
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	6 ml / da (Larva)	14 gün



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

CONELLA 20 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	28	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
200 g/l Chlorantraniliprole		

- Önce etiketi okuyunuz.
 - Evde kullanmayınız.
 - Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 - Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 - Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 - İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile Teması Halinde; Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur. Deriye bulaşmışsa, suyla iyice yıkayınız. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.

Gözler ile Teması Halinde; Kontak lens varsa ve çıkartılması kolaysa çıkartınız. Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

Soluması Halinde; Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur. Önemli miktarda maruz kalırsa doktora başvurunuz.

Yutulması Halinde; Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur. Gerekli görüldüğü takdirde bir doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

1. Chlorantraniliprole

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P264: Kullanmadan sonra su ile iyice yıkayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- İpek böceklerine etkisi olduğu için, uygulama anında ilacın rüzgarla yakındaki dut ağaçlarına taşınmasına engel olunuz.
- Boş ürün ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.



16 Haziran 2023
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL BÖLÜMÜ

ertar kimya
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereoslu Mah. Zafer Cad. No : 8
Sarıçam/ADANA Tel: 45 19 44 Fax: 456 19 47
Yüreğir V.D. 372 036 2756
Mersis No: 0372036275600012

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakine karşım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALIBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karşım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamamın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Armut, Ayva, Elma da Elma içkurduna karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. **CONELLA 20 SC** ile bu zararlı ile mücadelede en iyi etki her dölle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilacli bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armut ve ayvada tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz. İlacın etki süresi dikkate alınarak 14 gün sonra 1. dölle karşı uygulama tekrarlanmalıdır. İkinci ve daha sonraki döllere karşı da zararlı uygulamayı gerektirecek yoğunlukta olduğu takdirde aynı şekilde uygulamalara devam edilmelidir. Bu uygulamalar direnç ile ilgili bölümde belirtilen kurala bağlı kalarak farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünleri ile yapılmalıdır. Armut, ayva ve elmada sezon içinde 2'den fazla **CONELLA 20 SC** uygulaması yapmayınız.

Armut ve Elmada Yaprak galeriğüvesine karşı her ağaçtan 20 adet olmak üzere en az 5 ağaçtan yaprak alınarak larva sayımı yapılmalıdır. Yaprak başına 4 veya daha fazla canlı larva varsa parazitlenme oranı da çok düşük ise uygulama yapılır.

Bağda Salıkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeyssel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı henüz en üst seviyeye ulaşmayıp artışın devam etmesi, etkili sıcaklıklar toplamı birinci dölde 95-100 gün-de derece, ikinci dölde 450-460 gün-de derece, üçüncü dölde 970-980 gün-de derece ulaşması ve bitki fenolojisi; birinci dölde çiçek tomurcuğu, ikinci dölde koruk, üçüncü dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde ve bağda ilk yumurta görülmeyen uygulamaya karar verilir. Her dölle karşı bir uygulama yapılır. Bağda sezon içinde sofraik ürünlerde 2, şaraplık ürünlerde 1'den fazla **CONELLA 20 SC** uygulaması yapmayınız.

Erikte Şeftali güvesine karşı mücadelede en iyi etki için uygulama, zararlının yumurta bırakma döneminde, yumurtalar açılmadan ve meyveye giriş olmadan önce yapılmalıdır. Meyvede ilk larva görünür görünmez veya ilk ergin çıkışı görüldükten 10 gün sonra uygulama yapılır. Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak uygulama 14 gün arayla tekrarlanmalıdır. **CONELLA 20 SC** başka etki mekanizmalı insektisitler ile aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulanabilir. Erikte sezon içinde 2'den fazla **CONELLA 20 SC** uygulaması yapmayınız.



ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

CONELLA 20 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	28	İNSEKTİSİT (böcek ilacı)
200 g/l Chlorantraniliprole		

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

16 Haziran 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb. 8. Blok Zülfar Cad. No : 8
Sancam/Üsküdar /İstanbul /T.C.
Yenişehir /İstanbul /T.C.
Tic Sic No : 272036
Mersis No : 0372036275600012

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

Mısırdaki Bozkurta karşı zararının bulunması muhtemel olan tarlalarda, sıraya ekim yapılan yerlerde 10 ayrı yerde 3'er metrelik sıralar üzerinde en az 2 yeni bitkinin bulunduğu tarlalarda uygulama yapılmalıdır.

Mısırdaki Mısır koçankurdu ve Mısır kurduna karşı birinci üründe 50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilerek, tarlada zikzak şeklinde gidilerek 100 bitkideki buluşma (yumurta kümesi veya yaprak, gövde, koçan, tepe ve koçan püskülündeki yenikler) tespit edilir. Bulaşık bitki sayısının %5 ve üzeri olması durumunda kimyasal mücadele yapılır. İkinci üründe 50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilerek, tarlada zikzak şeklinde gidilerek 100 bitkideki yumurta paketi kontrolü ve sayımı yapılır. Yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile mücadeleye karar verilir. Mısır koçan kurdu yumurta kümeleri yaprak kınının gövdeyi saran iç yüzüne; Mısır kurdusu yumurta kümeleri ise genelde yaprakların alt yüzeyinde bulunur. Bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile 2 ya da 3 uygulama yapılmalıdır.

Mısırdaki sezon içinde 2'den fazla **CONELLA 20 SC** uygulaması yapmayınız.

Pamukta Dikenlikurta karşı pamuk tarlasında 50 dekar bir ünite olarak kabul edilir. Her üniteye en az 3 ayrı yerde 3 metrelik sıra uzunluğundaki tüm bitkiler incelenerek larvalar sayılır Tarla sürveyinde 3 metrelik pamuk sırasında ortalama 2 larva veya 4 açılmaya yakın yumurta bulunduğu koza sürveyinde %10 bulaşık koza varsa kimyasal mücadelesi yapılmalıdır.

Pamukta Pamuk yaprakkurdu karşı haftalık olarak yapılacak sürveylerde; 25 bitkide ortalama 2 yumurta paketi veya ocak ya da bitki başına 0,5 larva görüldüğünde kimyasal mücadeleye karar verilmelidir. Pamukta sezon içinde aynı yerde 2'den fazla **CONELLA 20 SC** uygulaması yapmayınız.

Pamukta Yeşilkurta karşı yapılacak sürveylerde 3 metrelik pamuk sırası uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğu uygulamaya karar verilmelidir. Pamukta sezon içinde aynı yerde 2'den fazla **CONELLA 20 SC** uygulaması yapmayınız.

Patateste Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15°C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararının yumurta, larva ve ergini arar. Herhangi bir dönemde rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmez. Patateste sezon içinde 2'den fazla **CONELLA 20 SC** uygulaması yapmayınız.

Şeftali, Nektarin ve Kayısıda Şeftali güvesine karşı mücadelede en iyi etki için uygulama, zararının yumurta bırakma döneminde, yumurtalar açılmadan ve meyveye giriş olmadan önce yapılmalıdır. Meyvede ilk larva zararı görünür görünmez veya ilk ergin çıkışı görüldükten 10 gün sonra uygulama yapılır. Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, yeni larva zararı ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci bir uygulama yapılabilir. Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak uygulama 14 gün arayla tekrarlanmalıdır. **CONELLA 20 SC** başka etki mekanizmalı insektisitler ile aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulanabilir. Şeftalide sezon içinde 2'den fazla **CONELLA 20 SC** uygulaması yapmayınız.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

CONELLA 20 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	28	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------	----	-----------------------------

200 g/l Chlorantraniliprole

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



16 Haziran 2025
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

ertar kimya
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereoslu Mah. Züfer Cad. No : 8
Sarıçam/ADANA Tel: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yatırım V.D: 372 036 2756
Mersis No: 0372036275600012

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

Şeftalide, Nektarin ve Kayısıda Doğu meyvegüvesine karşı mücadeleye sürgünlerde ilk giriş görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır. Uygulamaya tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra etkili sıcaklıklar toplamı 400 gün-derece ulaştığında başlanıp, ilacın etki süresine göre ikinci uygulama yapılır ya da gelişmesini tamamlayan birinci döl larvaların terk ettiği sürgünler görüldükten 15 gün sonra başlanmalı ve ilacın etki süresi dikkate alınarak, orta geççi çeşitlerde 2 uygulama, geççi çeşitlerde 3 uygulama yapılabilir. **CONELLA 20 SC** başka etki mekanizmalı insektisitler ile aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulanabilir. Şeftalide sezon içinde 2'den fazla **CONELLA 20 SC** uygulaması yapmayınız.

CONELLA 20 SC uygulamanın ardından bitki üzerinde ilaç kurumasından 1-2 saat sonra yağan yağışlardan etkilenmez, uygulamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

CONELLA 20 SC hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

CONELLA 20 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 28 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **CONELLA 20 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 28 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

CONELLA 20 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	28	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	-----------------------------

200 g/l Chlorantraniliprole

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks: 0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



16 Haziran 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

ertarkimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No: 8
Sarıçam/ADANA Tel: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yatırım U.D: 372 036 2756
Mersis No: 0172036275600012

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü