

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 19.12.2013 - 12935

KULLANILACI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Bağda ölükol (<i>Phomopsis viticola</i>)	500 g/100 L su (Yaz Uygulaması) 3500 g/100 L su (Kış Uygulaması)	14 gün
	Bağ mildiyöü (<i>Plasmopara viticola</i>)	500 g/100 L su	
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 g/da	14 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	1500 g/100 L su	14 gün
Kayısı	Yaprak delen (çil) (<i>Wilsonomyces carpophylus</i> = <i>Stigmina carpophila</i>)	625 g/100 L su (Normal dönem), 1250 g/100 L su (Dormant dönem)	14 gün
Mandarin	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i> f. sp. citri)	500 g/100 L su	14 gün
Şeftali	Şeftali yaprak kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	1500 g/100 L su	21 gün
Nektarin			
Zeytin	Zeytinlerde halkalı leke (<i>Spilocaea oleaginea</i> = <i>Cycloconium oleaginum</i>)	1. Uygulama: 1500 g/100 L su 2. Uygulama: 1000 g/100 L su	14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BLISS

İslanabilir Toz (WP)

GRUBU	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	----	----------------------------

%20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Kuşku duyulan tüm durumlarda tıbbi yardım sağlayın.

Solunması Halinde: Sakin olun ve temiz havaya çıkın. Hastayı rahatça nefes alabildiği bir konumda tutun. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Ciltle Teması Halinde: Bol su ve sabunla yıkayın. Zedelenme oluşursa tıbbi yardım isteyin.

Gözlerle Teması Halinde: Bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Tıbbi yardım isteyin.

Yutulması Halinde: Tıbbi yardım isteyin ve ürünün etiketini gösterin.

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ

Tıbbi tavsiye: gastrik yıkama. BAL, EDTA veya PENICILAMINE uygulayın. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

1. Teknik Bordo Bulamacı

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P264: Kullanmadan sonra su ile iyice yıkayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P363: Kirli giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Osman ARI
Daire Başkanı

ertarkimya
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mh. Zafer Cad. No : 8
Sarıçam/ADANA Tel: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yürürlük V.D: 372 036 2756
Mersis No: 0372036275600012

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ mildiyözü:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm'ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın etki süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır. Koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağda ölükol:

Dormant dönem uygulaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan (tomurcuk patlamasından) 3-4 hafta önce yapılır.

Yeşil aksam uygulaması: Vejetasyon döneminde aşağıdaki programa göre yapılır.

1. Uygulama: Gözlerin uyanma (tomurcuk patlaması) başlangıcında,
2. Uygulama: Sürgünler 8-10 cm uzunluğa ulaştığı dönemde,
3. Uygulama: Çiçeklenme döneminden hemen önce (çiçek salkımlarının belirlediği dönemde),
4. Uygulama: Çiçeklenme sonu-tane seti oluşumu başlangıcında yapılmalıdır.

Domateste Mildiyö:

Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeyen, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise ilaçlamaya çevrede ya da tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde),
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Kayısı Yaprak delen (çil):

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
 2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
- Kayılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. uygulama yapılmalıdır.

Şeftali ve Nektarinde Şeftali yaprak kıvrıklığı:

1. Uygulama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,
2. Uygulama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BLISS

İslanabilir Toz (WP)

GRUBU	M1	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	----	----------------------------

%20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114



KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
- Bitki koruma ürününü rüzgârlı havada kullanmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajını herhangi bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında açılmamış orijinal ambalajında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Ziller Cad. No : 8
Sarıçam/ADANA Tel.: 449 19 44 Fax: 456 19 47
Yüreğir Mersis No: 03 2036275600012

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
30 Haziran 2018

Mandarinde Kahverengi leke:

1. Uygulama: İlkbaharda taze sürgünlerin oluştuğu dönemde hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde,
2. ve diğer uygulamalarda kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak meyveler yaklaşık 4 cm çapa ulaşınca kadar devam edilir.

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbaharda sürgünler görülmeden hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Akdeniz Bölgesinde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

BLİSS hakkında bir şikayetiniz olması halinde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BLİSS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup **M1** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **BLİSS** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup **M1** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BLİSS

Islanabilir Toz (WP)

GRUBU	M1	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	----	----------------------------

%20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114



RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks: 0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No : 8
Sarıçam/ADANA Tel: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yürürlük No: 372 036 2756
Mersis No: 0872036275600012

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
YERİNDEN KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
30 Haziran 2016