

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 21.02.2023 / 12673

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Bağ mildiyösu (<i>Plasmopara viticola</i>)	100 ml/ 100 L su	10 gün
Biber (Sera)	Çökerten ve Fide Kök Çürüklüğü (<i>Phytophthora spp.</i>)	100 ml/da	1 gün
Domates (Sera)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	80 ml/ 100 L su	1 gün
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	80 ml/ 100 L su	1 gün
İspanak	Mildiyö (<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)	80 ml/da	7 gün
Kavun	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	80 ml/da	1 gün
Kornişon (Sera)	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	80 ml/ 100 L su	1 gün
Marul	Mildiyö (<i>Bremia lactucae</i>)	80 ml/da	1 gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	80 ml/da	1 gün
Soğan	Mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	80 ml/da	7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken yarıya kadar su ile depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanınca ya kadar karıştırma işleme devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

Damla sulama için: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar suyla doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilecek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

ertarkimya

ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

UMERTA SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	C8:45	H5:40	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorph			

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması Halinde; Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

Cilt ile Teması Halinde; Sabun ve su ile iyice yıkayın.

Göz ile Teması Halinde; Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akan su altında yıkayınız.

Yutulması Halinde; Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurunuz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114



Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

- 1. Ametoctradin
- 2. Dimethomorph

ZARARLILIK İŞARETLERİ



YARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H02:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H15:** Cilt tahrişine yol açar.
- H19:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H60F:** Üremeye zarar verebilir.
- H11:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖLEME İFADELERİ (P)

- P01:** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P173:** Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanınız.
- P331:** Döküntüleri toplayınız.
- P405:** Kilit altında saklayınız.
- P501:** İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.
- EU401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile önerilere mutlaka uyunuz.
- KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No : 8
Sarıçam/ADANA Tel.: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yüreğir V.D: 372 036 2756

Durmuş DEMİRE
Şirket Vekili

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ÇEVRE KONTROL VE MÜHÜR BÜYÜK

21 Şubat 2023

KALIBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 1 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ için gerekli su miktarı belirlenir.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoyu temiz su ile doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mildiyö; İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm boya ulaşıncaya başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Soğan Mildiyö; Günlük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir.

Kavun, Hıyar (sera) ve Kornişon (sera) Kabakgillerde Mildiyö; İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Domates (sera) Mildiyö; İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Patates Mildiyö; Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

Marul Mildiyö; Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanmalı ve birer hafta aralarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir.

Ispanak Mildiyö; İlaçlamaya hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 2. ve 3. ilaçlama ilacın etki süresi dikkate alınarak 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Biber (sera) Çökerten ve fide kök çürüklüğü; İlaçlamaya fidelerin dikiminden hemen sonra ikinci ilaçlama ise ilk ilaçlamadan 15 gün sonra; damla sulama ile yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

UMERTA SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre GRUP C8:45; H5:40 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için UMERTA SC'yi aynı üretim sezonu içerisinde üst üste en fazla iki defa uygulayınız ve toplamda üç uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (GRUP C8:45; H5:40 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışım yapılacaksa karışım yapılmadan önce ön karışım denemesi yapılmalıdır.



ERTAR KİMYA


Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

UMERTA SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	C8:45	H5:40	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorph			

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114



DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmada depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyeleri uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks: 0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

ertarkimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No: 8
Sarıçam/ADANA Tel: 456 19 44 Faks: 456 19 47
Yüreğir V.D: 372 036 2756

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

21 Subat 2023