

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 11143/01.06.2018

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasında Kalan Süre
Armut	Armut karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	125 ml/100 l su	21 gün
*Bağ	Bağ mildiyösü (<i>Plasmopara viticola</i>)	50 ml/100 l su	21 gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	150 ml/100 l su	14 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	125 ml/100 l su	21 gün
Turuncgiller	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i> f. sp. citri)	250 ml/100 l su	21 gün
Zeytin	Zeytinlerde halkalı Leke (<i>Spilocaea oleaginea</i> = <i>Cyclogonium oleaginum</i>)	125 ml/100 l su	21 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama Tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

CUBOX SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	M:1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	-----	----------------------------

65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile teması halinde: Kızarıklık, kabarma, kaşınma, sulanma ve acı gibi semptomlar ile cilt tahrişine neden olur. Kirli giysileri çıkarınız ve derhal nötral sabun ve su ile yıkayınız. Tıbbi yardım alınız.

Göz ile teması halinde: Kızarıklık, kabarma, kaşınma, sulanma ve acı gibi semptom ile göz tahrişine neden olur. Gözle temasında, en az 15 dakika boyunca düşük basınçlı ile gözleri yıkayınız. Tıbbi yardım alınız.

Solunması halinde: Burun akıntısı, boğaz ağrısı, sık nefes ve öksürme gibi semptomlar oluşabilir. Yeterli miktarın solunması ve absorbe olması durumunda, akut yutulma durumunda oluşan semptomlara benzer semptomlar oluşabilir. Temiz hava sağlayınız. Tıbbi yardım alınız, etiketi doktora gösteriniz.

Yutulması halinde: İshal, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı ile birlikte bağırsak iltihabına neden olabilir. Kulak çınlaması, baş dönmesi, tansiyon artışı, görüş ve titreme gibi sistemik etkilerle takip edebilir. Hastaya 200 ml-400 ml su ve derhal tıbbi yardım alınız.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

1. Bakır sülfat penta hidrat
2. Ethanol
3. Mono propylen glycol
4. Sodium dodecyl benzene sulfonate
5. Foamaster S 15

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H351: Kansere yol açma şüphesi var.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P201:** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280: Korumacı eldiven/korumacı kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimini arayın.
P362: Kirli giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

29 Kasım 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No : 8
Sarıçam ABANA Tel : 0362 19 44 Fax: 456 19 44
Yatırım V.D. 872 036 2756

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Armut karalesesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. uygulama: Beyaz rozet döneminde,
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ürünün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır.

Bağ mildiyözü:

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer Uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Domates mildiyözü:

Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığının 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın he yıl görülmeyişi alanlarda ise ilaçlamaya çevrede ya da tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

Elma karalesesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde),
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan preparatların etki süreleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke:

1. uygulama: Ilkbaharda taze sürgünlerin oluştuğu dönemde hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde,
2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak meyveler yaklaşık 4 cm çapa ulaşınca kadar devam edilir.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

CUBOX SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	M:1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	-----	----------------------------

65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Gerektiğinde belirtilere göre tedavi uygulanır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınılmalıdır.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz, boş ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

29 Kasım 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No : 8.
Sarıcam ADANA Tel: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yüreğir V.D: 372 036 2756

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

Ek

Zeytinlerde halkalı leke:

Akdeniz Bölgesinde:

1. uygulama: Hasattan sonra,
2. uygulama: İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Marmara Bölgesinde:

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Ege Bölgesinde:

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama: İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

*Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

CUBOX SC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup M: 1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **CUBOX SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M: 1 harici) fungisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

CUBOX SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	M:1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	-----	----------------------------

65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd.
Acıdereosb Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks: 0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

Ek

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

d d

29 Kasım 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No: 8
Sarıçam/ADANA Tel: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yüreğir V.D. 372 036 2756

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

Zel