

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 19.12.2023/12935

KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Bağda ölükol (<i>Phomopsis viticola</i>)	500 g/100 L su (Yaz Uygulaması) 3500 g/100 L su (Kış Uygulaması)	14 gün
	Bağ mildiyösü (<i>Plasmopara viticola</i>)	500 g/100 L su	
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 g/da	14 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	1500 g/100 L su	14 gün
Kayısı	Yaprak delen (çil) (<i>Wilsonomyces carpophylus = Stigmia carpophila</i>)	625 g/100 L su (Normal dönem), 1250 g/100 L su (Dormant dönem)	14 gün
Mandarin	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i> f. sp. citri)	500 g/100 L su	14 gün
Şeftali	Şeftali yaprak kıvrıcıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	1500 g/100 L su	14 gün
Zeytin	Zeytinlerde halkalı leke (<i>Spilocaea oleaginea = Cyclogonium oleaginum</i>)	1. Uygulama: 1500 g/100 L su 2. Uygulama: 1000 g/100 L su	14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

19 Aralık 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Ümit Uğur BAHÇE
Daire Başkanı

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BLISS

İslanabilir Toz (WP)

GRUP	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
%20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı		

- Önce etiketi okuyunuz.
 - Evde kullanmayınız.
 - Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 - Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 - Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 - İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Kuşku duyulan tüm durumlarda tıbbi yardım sağlayın.

Solunması Halinde; Sakin olun ve temiz havaya çıkın. Hastayı rahatça nefes alabildiği bir konumda tutun. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Ciltle Teması Halinde; Bol su ve sabunla yıkayın. Zedelenme olursa tıbbi yardım isteyin.

Gözlerle Teması Halinde; Bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Tıbbi yardım isteyin.

Yutulması Halinde; Tıbbi yardım isteyin ve ürünün etiketini gösterin.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Tıbbi tavsiye: gastrik yıkama. BAL, EDTA veya PENICILAMINE uygulayın. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

1. Teknik Bordo Bulamacı

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P264: Kullanmadan sonra su ile iyice yıkayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUHA01: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereoş Mah. Atatürk Cad. No : 8
Sarıcaambaşı Mah. 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yüreğir V.D 372 036 2756

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağda ölükol

Kış uygulaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz uygulaması: Vejetasyon döneminde aşağıdaki programa göre yapılır.

1. Uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. Uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3. Uygulama 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm'ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın etki süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır. Koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Domates mildiyösü

Mücadeleye çevrede domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Elma karalekesi

1. Uygulama: çiçek gözleri kabardığında (dal sırcası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. Uygulama: pembe çiçek döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. Uygulama: çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Kayısı yaprak delen (çil)

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. Uygulama: İlbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

Kaysılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. Uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvrıcılığı

1. Uygulama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,
2. Uygulama: İlbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BLISS

İslanabilir Toz (WP)

GRUP	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	----------------------------

%20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
- Bitki koruma ürününü rüzgârlı havada kullanmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajını herhangi bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında açılmamış orijinal ambalajında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

19 Aralık 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereesi Bulvarı, Katar Cad. No : 8
Sarıçam/ADANA Tel: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yüregi V.D: 372 036 2756

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

Mandarinde kahverengi leke

Uygulamalara sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması için bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu yağışların azaldığı ve sıcaklığın arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Zeytinlerde halkalı leke

Marmara Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbaharda sürgünler görülmeden hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, Ege Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, Akdeniz Bölgesinde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BLISS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup **M1** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **BLISS** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup **M1** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BLISS

Islanabilir Toz (WP)

GRUP	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	----------------------------

%20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

19 Aralık 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidere Organize San. Bölgesi Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks: 0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidere Organize San. Bölgesi Mah. Zafer Cad. No: 8
Sarıçam/ADANA Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks: 456 19 47
Yüreğir V.D: 372 036 2756

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü